

TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 14 september 2017

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 1

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tadalafil Teva 2,5 mg, filmomhulde tabletten
Tadalafil Teva 5 mg, filmomhulde tabletten
Tadalafil Teva 10 mg, filmomhulde tabletten
Tadalafil Teva 20 mg, filmomhulde tabletten
tadalafil

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Tadalafil Teva en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TADALAFIL TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit middel is bestemd voor de behandeling van erectiestoornissen en/of plasklachten die het gevolg zijn van een goedaardige prostaatvergroting. Dit middel bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep van geneesmiddelen die fosfodiesterase-remmers type 5 worden genoemd.

Erectiestoornis

Dit middel is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. Dit middel heeft laten zien dat het de mogelijkheid tot het krijgen van een erectie geschikt voor seksuele activiteit sterk verbetert.

Na seksuele prikkeling helpt dit middel de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit zorgt voor een verbetering van uw erectie. Dit middel werkt niet als u geen erectiestoornis heeft.

TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 14 september 2017

Bladzijde : 2

Het is belangrijk om te weten dat dit middel niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken (zie rubriek 3).

Goedaardige prostaatvergroting

Tadalafil Teva 5 mg is bestemd voor de behandeling van plasklachten die het gevolg zijn van een **goedaardige prostaatvergroting**.

Dit is het groter worden van de prostaat met de leeftijd. Symptomen zijn onder meer moeilijkheden bij het beginnen met plassen, het gevoel te hebben dat de blaas niet volledig wordt gelegeerd en vaker moeten plassen zelfs 's nachts.

Dit middel verbetert de doorbloeding en ontspant de spieren van de prostaat en blaas waardoor mogelijk de symptomen van de goedaardige prostaatvergroting verminderen. Er is aangetoond dat dit middel de plasklachten in 1-2 weken na begin van de behandeling verbetert.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U gebruikt een organisch nitraat in welke vorm dan ook of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep van geneesmiddelen ("nitraten") die gebruikt worden voor de behandeling van een beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris). Er is aangetoond dat dit middel de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts. (Zie rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?")
- U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
- U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.
- U heeft een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
- U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterior oogzenuwlijden (NAION), een aandoening die omschreven wordt als "verlamming van het oog".
- U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals tadalafil, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Indien u wordt behandeld voor een erectiestoornis

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 14 september 2017

Bladzijde : 3

Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts.

Als u wordt behandeld voor een goedaardige prostaatvergroting

Omdat een goedaardige prostaatvergroting en prostaatkanker dezelfde symptomen kunnen hebben, zal uw arts u eerst onderzoeken op prostaatkanker voordat de behandeling met dit middel voor een goedaardige prostaatvergroting wordt gestart.

Dit middel behandelt geen prostaatkanker.

Vertel het uw arts voordat u de tabletten inneemt als u een van de volgende aandoeningen heeft:

- sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen),
- multipel myeloom (beenmergkanker),
- leukemie (bloedcelkanker),
- een misvorming van uw penis,
- een ernstig leverprobleem,
- een ernstig nierprobleem.

Het is niet bekend of dit middel werkzaam is bij patiënten die:

- een bekkenoperatie hebben ondergaan,
- totale of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier, waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn doorgesneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie) hebben ondergaan.

Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, STOP dan de inname van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Dit middel is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tadalafil Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Neem Tadalafil Teva NIET als u al nitraten inneemt. (Zie: "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?")

Sommige geneesmiddelen worden beïnvloed door Tadalafil Teva of kunnen invloed hebben op hoe Tadalafil Teva werkt. Vertel uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen neemt:

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 14 september 2017

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 4

- een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met goedaardige prostaatvergroting te behandelen),
- andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen,
- riociguat,
- een 5-alfa-reductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van goedaardige prostaatvergroting),
- geneesmiddelen zoals ketoconazol tabletten (om een schimmelinfectie mee te behandelen) en proteaseremmers voor de behandeling van AIDS of HIV-infectie,
- fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om epilepsie mee te behandelen),
- rifampicine, erytromicine, claritromycine of itraconazol,
- andere behandelingen voor erectiestoornissen.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Zie rubriek 3 voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed dit middel zal werken en moet met voorzichtigheid worden genomen. Vraag uw arts voor meer informatie hierover.

Vruchtbaarheid

Bij honden die werden behandeld was er minder spermaproductie in de teelbal. Een vermindering in sperma is ook gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mannen die dit middel in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid. Controleer nauwkeurig hoe u reageert op de tabletten voordat u gaat autorijden of een machine bedient.

Tadalafil Teva bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel is alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.

Tadalafil Teva 2,5 mg en 5 mg voor een erectiestoornis

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 14 september 2017

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 5

De aanbevolen dosering is eenmaal daags een tablet van 5 mg, elke dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip.

Uw arts kan, afhankelijk van uw reactie op dit middel, de dosis naar 2,5 mg aanpassen. Dit zal gegeven worden als een tablet van 2,5 mg. Neem dit middel niet vaker dan een keer per dag.

Tadalafil Teva 10 mg en 20 mg voor een erectiestoornis

De aanbevolen begindosis is een tablet van 10 mg voor de seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te zwak is, kan de arts de dosis verhogen naar 20 mg. Dit middel is voor oraal gebruik.

U kunt dit middel ten minste 30 minuten voor de seksuele activiteit innemen.

Dit middel kan tot 36 uur na het innemen van de tablet werkzaam zijn.

Gebruik van dit middel eenmaal daags kan nuttig zijn voor mannen die verwachten twee keer per week of vaker seksueel actief te zijn.

Wanneer u dit middel eenmaal daags inneemt, bent u op elk moment van de dag in staat een erectie krijgen wanneer u seksueel wordt geprikkeld. Het is belangrijk om te weten dat dit middel niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen en kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen. Als u dit middel hebt ingenomen of als u bent van plan dit middel in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed 0,08 % of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten.

Goedaardige prostaatvergroting

De dosering is eenmaal daags een tablet van 5 mg elke dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip. Als u een goedaardige prostaatvergroting en tevens een erectiestoornis heeft blijft de dosering eenmaal daags een tablet van 5 mg.

Neem dit middel niet vaker dan een keer per dag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem contact op met uw arts. U kunt bijwerkingen krijgen zoals beschreven in rubriek 4.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem uw dosis zodra u zich dat herinnert, maar neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. U mag dit middel niet meer dan 1 keer per dag innemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 14 september 2017

Bladzijde : 6

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, STOP dan met het innemen van dit geneesmiddel en zoek dan direct medische hulp:

- Allergische reacties waaronder huiduitslag (doet zich soms voor).
- Pijn op de borst - gebruik geen nitraten maar zoek direct medische hulp (doet zich soms voor).
- Verlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van tadalafil (doet zich zelden voor). Als u zo'n erectie heeft en het houdt langer dan 4 uur aan, neem dat direct contact op met uw arts.
- U kunt ineens niet meer zien (doet zich zelden voor).

Andere bijwerkingen die zijn gemeld zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- hoofdpijn
- rugpijn
- spierpijn
- pijn in armen en benen
- blozen in het gezicht
- neusverstopping
- spijsverteringsproblemen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- duizeligheid
- maagpijn
- ziek voelen
- ziek zijn (overgeven)
- reflux
- wazig zien
- oogpijn
- moeite met ademen
- aanwezigheid van bloed in de urine
- hartkloppingen, een snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk
- neusbloedingen en oorsuizen
- zwellen van de handen, voeten of enkels en zich vermoeid voelen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- flauwvallen

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 14 september 2017

Bladzijde : 7

- stuipen
- voorbijgaand geheugenverlies
- zwelling van de oogleden, rode ogen, plotselinge vermindering of verlies van gehoor en netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak)
- bloeding van de penis
- aanwezigheid van bloed in het sperma
- toegenomen transpireren.

Ook zelden gemeld bij mannen die dit middel gebruiken zijn een hartaanval en beroerte. De meeste van deze mannen hadden al hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen.

Er is zelden melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen.

Enkele andere bijwerkingen die zich zelden voordeden bij mannen die dit middel innamen die niet werden gezien tijdens klinische onderzoeken omvatten:

- migraine
- opgezet gezicht
- ernstige allergische reactie die ervoor zorgt dat het gezicht en de keel opzwellen
- ernstige huiduitslag
- bepaalde stoornissen met invloed op de bloedtoevoer naar de ogen
- onregelmatige hartslag
- een beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (angina)
- plotselinge hartdood.

De bijwerking duizeligheid is vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die dit middel gebruiken. Diarree is vaker gemeld bij mannen boven de 65 jaar die dit middel gebruiken.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 14 september 2017

Bladzijde : 8

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is tadalafil.
Elke 2,5 mg tablet bevat 2,5 mg tadalafil.
Elke 5 mg tablet bevat 5 mg tadalafil.
Elke 10 mg tablet bevat 10 mg tadalafil.
Elke 20 mg tablet bevat 20 mg tadalafil.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, povidon, crospovidon en natriumstearylfumaraat
- De filmomhulling is gemaakt van poly(vinylalcohol), macrogol, titaniumdioxide (E171), talk en geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Tadalafil Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tadalafil Teva 2,5 mg is een oker- tot geelkleurige, ronde, filmomhulde tablet. Aan de ene kant gemerkt met "2,5" en aan de andere kant glad. Diameter: 5,0 mm.

Tadalafil Teva 5 mg is een oker- tot geelkleurige, ovaalvormige, filmomhulde tablet. Aan de ene kant gemerkt met "5" en aan de andere kant glad. Lengte: 8,1 mm, breedte: 4,1 mm.

Tadalafil Teva 10 mg is een oker- tot geelkleurige, ovaalvormige, filmomhulde tablet. Aan de ene kant gemerkt met "10" en aan de andere kant glad. Lengte: 11,1 mm, breedte: 6,4 mm.

Tadalafil Teva 20 mg is een oker- tot geelkleurige, ovaalvormige, filmomhulde tablet. Met aan de ene kant een breuklijn en gemerkt met "2" aan de linker zijde van de breuklijn en "0" aan de rechter zijde van de breuklijn. De andere kant van de tablet is glad. Lengte: 14,0 mm, breedte: 8,0 mm.
De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 14 september 2017

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 9

Tadalafil Teva 2,5 mg is verkrijgbaar in verpakkingen met 14, 28, 30 of 56 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen, of 28x1 filmomhulde tabletten in geperforeerde eenheidsafleververpakkingen.

Tadalafil Teva 5 mg is verkrijgbaar in verpakkingen met 14, 18, 28, 30 of 84 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen, of 14x1, 28x1, 84x1, 98x1 of 112x1 filmomhulde tabletten in geperforeerde eenheidsafleververpakkingen.

Tadalafil Teva 10 mg is verkrijgbaar in verpakkingen met 4, 12, 18 of 28 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen, of 4x1 of 24x1 filmomhulde tabletten in geperforeerde eenheidsafleververpakkingen.

Tadalafil Teva 20 mg is verkrijgbaar in verpakkingen met 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48 of 56 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen, of 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1 of 36x1 filmomhulde tabletten in geperforeerde eenheidsafleververpakkingen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Fabrikant

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)
Debrecen, Pallagi út 13
H-4042
Hongarije

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,
BN22 9AG
Verenigd Koninkrijk

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA, Haarlem
Nederland

TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 14 september 2017

Bladzijde : 10

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80.
31-546, Krakau
Polen

TEVA PHARMA S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica
50016, Zaragoza
Spanje

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3
89143, Blaubeuren
Duitsland

Merckle GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079, Ulm
Duitsland

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25
10000, Zagreb
Kroatië

Actavis Export International Ltd.
HF 62 Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia
BBG3000
Malta

In het register ingeschreven onder

RVG 114749, filmomhulde tabletten 2,5 mg
RVG 114750, filmomhulde tabletten 5 mg
RVG 114751, filmomhulde tabletten 10 mg
RVG 114752, filmomhulde tabletten 20 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk	Tadalafil ratiopharm 2.5 mg Filmtabletten Tadalafil ratiopharm 5 mg Filmtabletten
------------	--------------------------------------------------------------------------------------

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 14 september 2017

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 11

	Tadalafil ratiopharm 10 mg Filmtabletten Tadalafil ratiopharm 20 mg Filmtabletten
België	Tadalafil Teva 2,5 mg filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 5 mg filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 10 mg filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 20 mg filmomhulde tabletten
Tsjechië	Tadalafil Teva 2,5 mg, potahované tablety Tadalafil Teva 5 mg, potahované tablety Tadalafil Teva 10 mg, potahované tablety Tadalafil Teva 20 mg, potahované tablety
Duitsland	Tadalafil-ratiopharm 2,5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 10mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 20mg Filmtabletten
Denemarken	Tadalafil Teva
Spanje	Tadalafilo Teva 2.5 mg comprimidos recubiertos con película EFG Tadalafilo Teva 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG Tadalafilo Teva 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG Tadalafilo Teva 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finland	Tadalafil ratiopharm 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Frankrijk	Tadalafil Teva 2.5 mg comprimé pelliculé Tadalafil Teva 5 mg comprimé pelliculé Tadalafil Teva 10 mg comprimé pelliculé Tadalafil Teva 20 mg comprimé pelliculé
Hongarije	Tadalafil Actavis 5 mg filmtabletta Tadalafil Actavis 10 mg filmtabletta Tadalafil Actavis 20 mg filmtabletta
Ierland	Tadalafil Teva 10 mg Film-coated Tablets Tadalafil Teva 20 mg Film-coated Tablets
IJsland	Tadalafil ratiopharm 2.5 mg filmuhúðaðar töflur Tadalafil ratiopharm 5 mg filmuhúðaðar töflur Tadalafil ratiopharm 10 mg filmuhúðaðar töflur Tadalafil ratiopharm 20 mg filmuhúðaðar töflur
Italië	Tadalafil Teva
Kroatië	Tadalafil Pliva Hrvatska 2,5 mg filmom obložene tablete Tadalafil Pliva Hrvatska 5 mg filmom obložene tablete Tadalafil Pliva Hrvatska 10 mg filmom obložene tablete

**TADALAFIL TEVA 2,5 MG
TADALAFIL TEVA 5 MG
TADALAFIL TEVA 10 MG
TADALAFIL TEVA 20 MG
filmomhulde tabletten**

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 14 september 2017

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 12

	Tadalafil Pliva Hrvatska 20 mg filmom obložene tablete
Luxemburg	Tadalafil-ratiopharm 2,5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 10mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 20mg Filmtabletten
Nederland	Tadalafil Teva 2.5 mg, filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 5 mg, filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 10 mg, filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 20 mg, filmomhulde tabletten
Noorwegen	Tadalafil Teva 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Tadalafil Teva 5 mg filmdrasjerte tabletter Tadalafil Teva 10 mg filmdrasjerte tabletter Tadalafil Teva 20 mg filmdrasjerte tabletter
Polen	Tadalafil Teva
Portugal	Tadalafil Teva 2,5 mg comprimidos revestidos por película Tadalafil Teva 5 mg comprimidos revestidos por película Tadalafil Teva 10 mg comprimidos revestidos por película Tadalafil Teva 20 mg comprimidos revestidos por película
Roemenië	TADALAFIL TEVA 2,5 mg comprimate filmate TADALAFIL TEVA 5 mg comprimate filmate TADALAFIL TEVA 10 mg comprimate filmate TADALAFIL TEVA 20 mg comprimate filmate
Zweden	Tadalafil Teva 2,5 mg filmdragerade tabletter Tadalafil Teva 5 mg filmdragerade tabletter Tadalafil Teva 10 mg filmdragerade tabletter Tadalafil Teva 20 mg filmdragerade tabletter
Verenigd Koninkrijk	Tadalafil 2.5 mg Film-coated Tablets Tadalafil 5 mg Film-coated Tablets Tadalafil 10 mg Film-coated Tablets Tadalafil 20 mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2017

0917.15v.AV

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbq-meb.nl).